



Մանկական արթրիտ

01.12.2019

Արթրիտը տարածված քրոնիկ աուտոիմունային հիվանդություն է, որի դեպքում ախտահարվում են ծայրամասային հոդերը: Ըստ վիճակագրության՝ յուրաքանչյուր 1000-րդ երեխայի մոտ կյանքի առաջին տարիների ընթացքում զարգանում է արթրիտ, և որպես կանոն այն ախտորոշում են մինչև 4 տարեկանը:

Երեխաների մոտ արթրիտի հետևանքով ախտահարվում են ծնկները, մեջքը, արմուկները և ուսերը: Քանի որ երեխաները հաճախ ճիշտ չեն կարողանում նկարագրել, թե որ հատվածում է ցավում, դժվարանում է հիվանդության ախտորոշումը: Այնուամենայնիվ կան հստակ սիմպտոմներ, որոնք օգնում են տարբերակել արթրիտը.

- Ծարժվելու, քայլելու ցանկության բացակայություն
- Տպավորություն է ստեղծվում, թե երեխան խնայում է իրեն
- Երեխան կաղում է առավոտյան կամ շարժումները շատ սահմանափակ են

Որո՞նք են հիվանդության զարգացման պատճառները.

- Վնասվածքներ
- Վիտամինների անբավարարություն
- Ինֆեկցիաներ
- Վիրուսներ
- Տրոսահարում
- Նյարդային համակարգի հիվանդություններ
- Նյութափոխանակության խանգարումներ

Ցիկլիկ ցիտրուլինացված պեպտիդի նկատմամբ հակամարմինը (Anti CCP) հանդիսանում է ռևմատոիդ արթրիտի վաղ մարկեր: Այն հնարավոր է հայտնաբերել արյան մեջ հիվանդության սիմպտոմների ի հայտ գալուց դեռ 1-1.5 տարի առաջ:

Անհրաժեշտ լաբորատոր հետազոտություններ.

- Anti CCP
- C-ռեակտիվ սպիտակուց
- Ռևմատոիդ գործոնի (RF)
- Հակաստրեպտոլիզին O (ASLO)

