Հղիության առաջին եռամսյակի սկրինինգային թեստ (կրկնակի թեստ) 01.12.2019

Հղիության առաջին եռամսյակի սկրինինգային թեստը նշանակվում է 10-13 շաբաթական (և 6 օրական) ժամկետում՝ հայտնաբերելու համար պտղի մոտ քրոմոսոմային տրիսոմիաների (Դաունի, Էդվարդսի, կամ Պատաուի սինդրոմ) կամ զարգացման անոմալիաների հավանականությունը: Սկրինինգային թեստն իր մեջ ներառում է PAPP-A և FreeHCG հետազոտությունները:

Ե՞րբ է նշանակվում թեստը

1. Առաջին եռամսյակում պլանային հետազոտության ժամանակ, մասնավորապես պաթոլոգիաների զարգացման հավանակնության դեպքում:
2. 35+ տարիքում
3. Նախորդ հղիությունների ընթացքում զարգացման պաթոլոգիաների կամ քրոմոսոմային տրիսոմիաների առկայության դեպքում:
4. Ընտանիքում գենետիկական հիվանդությունների առկայության դեպքում:
5. Հղիության վաղ շրջանում որոշակի դեղամիջոցների օգտագործման դեպքում:

Ուշադրություն!!!
Միայն տվյալ հետազոտության պատասխանով հնարավոր չէ պարզել կա՞ արդյոք խնդիր պտղի մոտ, թե ոչ, այն ցույց է տալիս միայն խնդրի առկայության հավանակնությունը:

«Հայ ծնողների ակումբ»
Կայք՝ www.ArmParents.com
Ֆեյսբուք՝ Հայ ծնողների ակումբ
Հեռ.՝ 091 416247

«Բիոմեդ» ախտորոշման լաբորատորիա
Կայք՝ www.biomed.am
Ֆեյսբուք՝ Biomed
Հասցե՝ Եղ. Թադևոսյան 5 և Գայի պողոտա 8
Հեռ.՝ 010 483879, 011 483879