



Ասկարիդոզ, Լյամբլիոզ.

01.12.2019

Ամենատարածված մակաբույծները երեխաների շրջանում

Ամեն տարի մոտ 0.8 միլիարդ մարդ ամբողջ աշխարհում հիվանդանում է ասկարիդոզով, որոնց գերակշիռ մասը կազմում են երեխաները: Վարակի հիմնական պատճառ են հանդիսանում կեղտոտ ձեռքերը, վատ լվացված սնունդը, ինչպես նաև ասկարիդի ձվերով պատահականորեն վարակված տնային գործածության իրերը: Աղիքներում հայտված ասկարիդի հարսնյակն անցնում է արյան մեջ՝ 4-րդ օրը հայտնվելով լյարդում, այնուհետև վարակվելուց 1-2 շաբաթ անց արյան շրջանառության փոքր շրջանով հասնում է ավելուներ: Բարդ դեպքերում, եթե թոքեր են հասնում մեծ քանակությամբ ասկարիդներ, հիվանդի մոտ զարգանում է Էոզինոֆիլային թոքաբորբ: Ասկարիդի հարսնյակն ավելուներում զարգանում է 3 շաբաթվա ընթացքում: Այդ ընթացքում հազի միջոցով անցնելով վերին շնչուղիներ՝ հայտնվում են բերանի խոռոչում, որտեղից էլ կուլ տալու հետևանքով արդեն՝ բարակ աղիք: Ասկարիդները կարող են տարածվել օրգանիզմում՝ հասնելով տասներկուամատնյա աղիք, լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ:

Կլինիկական սիմպտոմներն ի հայտ են գալիս 2 փուլով.

Առաջին փուլի նշաններն են՝

- Թուլություն,
- Մաշկային ցան, քոր,
- Ցավ կրծքավանդակում,
- Գլխացավ

Երկրորդ՝ աղիքային փուլի նշաններն են՝

- Մարսողական խանգարումներ,
- Փորացավ,
- Ախորժակի կորուստ,
- Սրտխառնոց,
- Մարսողական խանգարումների արդյունքում երեխան սկսում է նիհարել, ընկնում է իմունսիտետը:

Նյարդային համակարգը ևս տուժում է, ինչն արտահայտվում է հետևյալ սիմպտոմներով

- Հոգևածություն,
- Տրվածություն,
- Հիշողության վատացում,
- Գրգռվածություն,
- Քնի խանգարում:

Հաջորդ ամենատարածված հիվանդությունը երեխաների շրջանում լյամբլիոզն է:

Հարուցիչը միաբջիջ մակաբույծ լյամբլիան է, որը մակաբուծում է մարդու բարակ աղիներում: Լյամբլիայի ցիտաները բավականին երկար կարող են պահպանել կենսունակությունը մարդու օրգանիզմից դուրս, օրինակ՝ կենցաղային իրերի վրա՝ դռան բռնակ, սրբիչ, խաղալիքներ և այլն: Վարակվել հնարավոր է հիվանդ ընտանի կենդանիներից, որոնց բրդի վրա երկար պահպանվում են լյամբլիայի ցիտաները: Լյամբլիայի ակտիվ բազմացման համար անհրաժեշտ պայման է ցածր իմունիտետը, ինչը բնորոշ է մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին:

Լյամբլիոզի սիմպտոմներն ի հայտ են գալիս իմունիտետի թուլացման դեպքում, ինչի պատճառ կարող են դառնալ սովորական գրիպը կամ մրսածությունը: Լյամբլիոզի սիմպտոմներն են՝

- Մարսողական խանգարումներ,
- Աղիքային խնդիրներ,
- Միմյանց փոխարինող լուծ և փորկապություն,
- Դեղնավուն կղանք, հաճախ լորձի առկայությամբ,
- Սրտխառնոց և գլխապտույտ,
- Մարսողական խանգարումների հետևանքով առաջանում է ավիտամինոզ,
- Մաշկային ցան, որը հաճախ շփոթում են սննդային ակերգիայի կամ դիաթեզի հետ
- Մաշկի պիգմենտացիան ևս կարող է փոխվել, ավելի մգանալ կամ դեղնել, ի հայտ է գալիս այսպես կոչված «մարմարե քիթ» սիմպտոմը, որը սպեցիֆիկ է լյամբլիոզի համար:

Ասկարիդոզը և լյամբլիոզը հնարավոր է հայտնաբերել 2 տեսակի անալիզով.

1. Կղանքի միջոցով հայտնաբերվում են ասկարիդի, լյամբլիայի ձվիկները
2. Արյան միջոցով հայտնաբերվում են ասկարիդի, լյամբլիայի հանդեպ հակամարմինները:

Ժամանակին հայտնաբերված մակաբույծներից հնարավոր է հեշտությամբ ձերբազատվել համապատասխան բուժումից հետո՝ նորից վերադարձնելով երեխային իր անհոգ և ուրախ մանկությունը:



«Հայ ծնողների ակումբ»
Կայք՝ www.ArmParents.com
Ֆեյսբուք՝ [Հայ ծնողների ակումբ](#)
Չեռ.՝ 091 416247



«Բիոմեդ» ախտորոշման լաբորատորիա
Կայք՝ www.biomed.am
Ֆեյսբուք՝ [Biomed](#)
Հասցե՝ Եղ. Թադևոսյան 5 և Գայի պողոտա 8
Չեռ.՝ 010 483879, 011 483879